



Szpital św. Leona w Opatowie

Pacjent(ka) (imię nazwisko)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PESEL

Gastroskopia jest badaniem, które polega na wprowadzeniu specjalnego wziernika (gastroskopu) przez jamę ustną do przełyku, a następnie do żołądka i dalej do dwunastnicy. Celem zabiegu jest optyczna ocena śluzówki tej części przewodu pokarmowego oraz jeśli istnieje potrzeba - pobranie wycinków do badania mikroskopowego ze znalezionych tam zmian. W wypadku krwawienia z tej części przewodu pokarmowego wykonuje się próbę endoskopowego opanowania krwawienia. W przypadku znalezienia polipów, może się okazać koniecznym ich usunięcie za pomocą pętli diatermicznej. W trakcie gastroskopii istnieje możliwość podania dożylnych środków uspokajających i/lub przeciwbólowych.

W trakcie gastroskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej rzadko możliwe jest wystąpienie następujących powikłań:

- perforacja (przeziurawienie) przełyku, odma i zapalenie śródpiersia
- perforacja żołądka lub dwunastnicy, zapalenie otrzewnej
- krwotok z przewodu pokarmowego
- omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym, inne powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz oddechowego (np. niewydolność krążeniowo-oddechowa)
- możliwość wymiotów i zachłyśnięcia się treścią z żołądka następstwem którego może być zachłyستowe zapalenie płuc
- chociaż wszystkie zabiegi wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku lub sprzętem poddawany każdorazowo dezynfekcji i/lub sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć możliwości zarażenia wirusami zapalenia wątroby (m.in. HBV i HCV) lub innymi drobnoustrojami
- część z ww. powikłań może wymagać operacyjnego otwarcia jamy brzusznej lub klatki piersiowej, przetoczenia krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- niekiedy wystąpić mogą powikłania, których nie sposób przewidzieć, np. reakcja uczuleniowa na lek znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej, swędzenia, po wstrząs anafilaktyczny)
- ponieważ część z tych powikłań jest poważna to mogą się one, wyjątkowo rzadko, zakończyć zgonem.

**Aby zmniejszyć ryzyko w/w powikłań prosimy odpowiedzieć na następujące pytania
(zaznacz właściwą odpowiedź):**

1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień po zranieniach lub usunięciu zębów?
TAK ☐ NIE ☐
2. Czy zaobserwował/a Pani/Pan skłonność do łatwego powstawania „siniaków” na skórze?
TAK ☐ NIE ☐
3. Czy jest Pani/Pan uczulona na środki znieczulające, lekarstwa, jodynę?
TAK ☐ NIE ☐

4. Czy ma Pani/Pan wszczepiony „rozrusznik” serca lub endoprotezę ?

TAK ☐

NIE ☐

5. Czy jest Pani w ciąży?

TAK ☐

NIE ☐

6. Czy jest Pani/Pan leczona/y z powodu chorób serca lub płuc (np. wada serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, astma oskrzelowa)?

TAK ☐

NIE ☐

7. Czy przyjmuje Pani/Pan leki wpływające na krzepkość krwi(np. aspiryna, acenocumaryl).

TAK ☐

NIE ☐

Jeżeli tak, to jakie?

8. Czy jest Pani/Pan leczona/y z powodu innych chorób przewlekłych (np. jaskra, epilepsja)?

TAK ☐

NIE ☐

Jeżeli tak, to jakie?

9. Czy był/a Pani/Pan dotychczas operowana/y?

TAK ☐

NIE ☐

Jeśli tak, to proszę podać z jakiego powodu

.....

.....

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pytania. Lekarz postara się wyjaśnić Pani/Panu wszystkie wątpliwości.

Zachowanie po zabiegu: z powodu znieczulenia gardła prosimy przez dwie godziny po zabiegu nic nie jeść i nie pić. Prosimy poinformować lekarza jeśli w kilka godzin po zabiegu odczuwać będzie Pani/Pan silne bóle brzucha lub zaobserwują Państwo czarny stolec. Jeżeli otrzymali Państwo zastrzyk uspokajający i/lub przeciwbólowy nie mogą Państwo w przeciągu najbliższych 24 godzin prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać urządzeń precyzyjnych, podpisywać ważnych dokumentów, **do domu należy wrócić z opiekunem.**

Poinformowany(a) o możliwości wystąpienia powyższych powikłań i po uzyskaniu odpowiedzi lekarza na zadane pytania, wyrażam zgodę na gastroskopię oraz na ewentualne pobranie wycinka(ów) z przełyku, żołądka lub dwunastnicy do badania histopatologicznego, a także na endoskopowe usunięcie polipów jeżeli w trakcie zabiegu lekarz uzna to za konieczne. Ponadto wyrażam zgodę na zabieg tamowania krwawienia przy użyciu endoskopu w przypadku, gdy w trakcie zabiegu stwierdzone zostanie krwawienie. Wyrażam także zgodę na ewentualne podanie dożylnie środków uspokajających i/lub przeciwbólowych.

Wyrażam również zgodę na wgląd w obraz gastroscopowy lekarzom szkolącym się w wykonywaniu tego zabiegu (opcjonalnie) -w razie potrzeby -wykreślić.

Miejsce.

Data

Podpis pacjenta/ki

podpis lekarza